


# Amylo-X<sup>®</sup>: botrite su uva da tavola, Italia 2011



Testimone n.t.  
19% grappoli colpiti; 2% superficie grappolo colpita

Mazzarone (CT), Italia, 2011


Coltura: uva da tavola cv Italia

Epoca interventi: A=30/6, B=4/8, C=21/9, D=28/9, E=5/10, F=13/10, G=20/10, H=29/10; Volume di bagnatura: 700 l/ha

Standard: Scala (37.4% pyrimethanil), Cantus (50% boscalid), Teldor Plus (42.8% fenhexamid), Dosaggi: kg-l/ha

Rilievo: alla raccolta (07-11); Indice di attacco = % grappoli colpiti x % superficie grappolo colpita/100

# Amylo-X<sup>®</sup>: botrite su uva da tavola, Italia 2011



Testimone n.t.  
74% grappoli colpiti; 28% superficie grappolo colpita

Bisceglie (BT), Italia, 2011


Coltura: uva da tavola cv Italia

Epoca interventi: A=7/9, B=16/9, C=26/9, D=3/10, E=10/10, F=17/10; Volume di bagnatura: 700 l/ha

Standard: Switch (37.5% cyprodinil, 25% fludioxonil), Dosaggi: kg-l/ha

Rilievo: alla raccolta (27-10); Indice di attacco = % grappoli colpiti x % superficie grappolo colpita/100

# Amylo-X®: marciume acido su uva da tavola, Italia 2011



Testimone n.t.  
73% grappoli colpiti; 30% superficie grappolo colpita

Bisceglie (BT), Italia, 2011


Coltura: uva da tavola cv Italia

Epoca interventi: A=7/9, B=16/9, C=26/9, D=3/10, E=10/10, F=17/10; Volume di bagnatura: 700 l/ha

Standard: Switch (37.5% cyprodinil, 25% fludioxonil), Dosaggi: kg-l/ha

Rilievo: alla raccolta (27-10); Indice di attacco = % grappoli colpiti x % superficie grappolo colpita/100

# Amylo-X<sup>®</sup>: botrite su uva da tavola, Italia 2012 (non-GEP)



Testimone n.t.  
27% grappoli colpiti; 7% superficie grappolo colpita

Casamassima (Bari).


Coltura: Uva da tavola.

Epoca interventi: A=16/7, B=6/8, C=11/9. Volume di bagnatura: ???.

Standard = Geoxe (50% fludioxonil), Teldor (50% fenhexamid). Dosaggi in g – ml/100 L

Rilievo: 18/9. Indice di attacco = % grappoli colpiti x % superficie grappolo colpita/100.

# Amylo-X®: botrite su uva da tavola, Italia 2013 (non-GEP)



Acquaviva delle Fonti (Bari).

Coltura: Uva da tavola cv Italia

Epoca interventi: A=8/7 (pre-chiusura grappolo), B=2/8 (invaletta), C=2/9, D=9/9. Volume di bagnatura: ??? L/ha.

Standard = Geoxe (50% fludioxonil), Teldor (50% fenhexamid). Dosaggi in g – ml/100 L

Rilievo: 26/10. Indice di attacco = % grappoli colpiti e % indice di attacco secondo Mc Kinney su 100 grappoli.